

Rotina

| | |
|------------------------|---|
| HPV | 2 doses a partir dos 9 anos de idade para meninas e a partir dos 11 anos para meninos |
| Hepatite B | Não vacinados: 3 doses com intervalo de 30 dias |
| DTPA | 1 dose a cada 10 anos . Esquema incompleto: 3 doses com antitetânica |
| Meningo B | 2 doses com intervalo de 2 meses |
| Pneumocócica 13 | Esquema incompleto: 2 doses com intervalo de 2 meses/ a partir de 16 anos com doenças respiratórias indicação: de 1 dose a cada 5 anos |
| Meningo ACWY | Reforço com 11 anos ou 5 anos após a última dose . Não vacinados: duas doses com intervalo de 5 anos |
| Influenza | 1 dose anual |

Recomendado para não vacinados ou esquema incompleto

| | |
|--|---|
| Hepatite A | Não vacinados: 2 doses com intervalo de 30 dias |
| Tríplice viral(sarampo caxumba rubéola) | Não vacinados: 2 doses 0-6 meses. |
| Varicela | Não vacinados: 2 doses 0-6 meses |
| Febre Amarela | 1ª dose antes dos 5 anos , tomar 2ª dose / caso 1ª dose a partir de 5 anos considerar dose única |
| Dengue | 3 doses para soropositivos |
| Covid | Acesse dados atualizados em SBIM/ covid19 |